



05/05/2026

ACTU'PLAINE

CONSEILLERS PV

#### Actualités cette semaine ...

- **BETTERAVES** : Gestion du désherbage et ravageurs.
- **BLE** : Quel programme fongicide choisir au stade dernière feuille étalée avec les pluies ?
- **LIN FIBRE DE PRINTEMPS** : Levées rapides d'adventices, désherbages complémentaires.
- **MAÏS** : Nos conseils de désherbage selon votre situation.
- **ORGES** : Orge hiver : Fongicide après les pluies ? Orge de printemps : désherbage, régulateur, fongicide.
- **POMMES DE TERRE** : Quel désherbage choisir ? Pensez à réserver MILEOS.
- **PROTEAGINEUX** : Protéagineux d'hiver : Choix du fongicide. Protéagineux de printemps : rattrapage anti-dicot.

## BETTERAVES

### ➤ Situation en plaine

Les pluies ont été bénéfiques aux betteraves qui se sont bien développées en quelques jours et les adventices aussi parfois.

### ➤ Désherbage de post-levée

Avant toute intervention, aller voir vos parcelles ! Plus on intervient sur un stade jeune de l'adventice, plus l'efficacité sera bonne !

Pour rappel, les spécialités commerciales [...]

Nos préconisations T3/T4 : [...]

### ➤ Désherbage betteraves « conviso »

Le 1<sup>er</sup> passage est en général réalisé (2 feuilles des chénopodes). Le 2<sup>ème</sup> traitement intervient [...]

**En situation classique :** [...]

### ➤ Désherbage anti-graminées

Dans certaines parcelles sont souvent observées, des graminées levées ou en cours de levées. **Une intervention peut être justifiée aujourd'hui.**

Utiliser de l'huile végétale [...]

Nos préconisations : [...]

### ➤ Binage

Dans certaines parcelles, les adventices sont bien développées et les interventions chimiques ne seront pas suffisantes en efficacité (chénopodes, éthuses, renouées liserons à plus de 2 feuilles).

Dans ces situations, le binage pourra [...]

### ➤ Ravageurs

**PUCERONS** : Les premiers pucerons verts sont observés en plaine. Il faut être très vigilant à partir du stade « 2 feuilles vraies » des betteraves.[...]

**TEPPEKI** : [...]

**VERSEON (ou AXALION)** : Nouvelle dérogation de 120 jours valable jusqu'au 2 juillet pour un insecticide : [...]

**MOVENTO (spirotretamat 100g/l) a obtenu [...]**

**Dans cette lutte, pensez à détruire dès maintenant les repousses de betteraves sur les tas de terre pour les pucerons.**

**PARASITISME SOUTERRAIN :** Des dégâts lié au parasitisme souterrain [...]

**RESSEMIS :** En cas de fortes attaques [...]

## BLE

### ➤ Situation en plaine

**Avec les conditions connues fin de semaine passée, les stades ont largement évolué avec beaucoup de parcelles qui sont dorénavant au stade « Dernière Feuille Étalée – gonflement ». Certaines parcelles commencent à épier.**

### ➤ Azote

Profiter des pluies actuelles pour solder les apports d'azote.

### ➤ Désherbage

**Au stade « DERNIERE FEUILLE ETALEE » : solder toute application de CHARDEX et/ou de STARANE 200.**

**A ce stade, ne plus réaliser d'application [...]**

Restent utilisables : [...]

### ➤ Réactions physiologiques

Nous observons toujours de nombreuses réactions physiologiques en parcelles : même sur des parcelles n'ayant eu aucune intervention phyto. Elles sont plus parquées suite à des interventions [...]

### ➤ Surveillance maladies

**Suite aux pluies du week-end dernier ; la situation à dernière feuille étalée doit être réajustée → La septoriose doit être dorénavant prise en compte en toute situation tout comme la rouille jaune et la rouille brune.**

**La pression septoriose est plus marquée sur les semis du 1 au 15 octobre mais elle progressera aussi sur les semis de fin octobre, d'autant plus si de nouvelles pluies surviennent cette semaine.**

**A Dernière feuille étalée : c'est donc le [...]**

**Nos préconisations : [...]**

## LIN FIBRE DE PRINTEMPS

### ➤ Désherbage complémentaire

**Les premières parcelles de lins semées arrivent sont au stade « 4cm », c'est le moment de faire le tour des linières pour juger de l'efficacité des désherbages de post semis/prélevée. En grande majorité, leur efficacité est moyenne et nous observons souvent des chénopodes, renouées liseron, repousse de colza qui sont en cours de levée voir à « 2 feuilles ».**

**Pour envisager un rattrapage, il faut attendre un bon enracinement des radicules à plus [...]**

**Nos préconisations : [...]**

## MAIS

**Avec le retour de la pluie ce week-end et les conditions douces, de nombreuses parcelles sont aujourd'hui bien levées (de levée à 4 feuilles). Il reste quelques parcelles à semer notamment derrière des dérochés.**

### ➤ Derniers semis (dérobés)

Compte tenu des conditions d'humectation, le maïs va profiter de conditions idéales pour lever rapidement. Toutefois, en fonction des quantités d'eau reçues (orages), il faudra veiller à bien laisser ressuyer l'horizon de surface.

**La profondeur de semis : [...]**

Densité de semis et variétés : [...]

## ➤ Fertilisation

Différentes formes d'azote peuvent être utilisées, toutefois pour les apports réalisés avec de l'urée n'oubliez pas de l'enfourer pour limiter les pertes par volatilisation.

**Stratégie d'apport : Le maïs est une culture à croissance rapide** mobilisant des quantités importantes en éléments nutritifs du stade [...]

## ➤ Ravageurs

**TAUPIN : Le maïs est sensible aux attaques de taupins du semis jusqu'au stade « 6-8 feuilles ».**

Étant donné que des dégâts de taupins sont visibles dans certaines parcelles de betteraves (terres légères principalement), il est important pour les parcelles à risques [...]

**CORBEAUX :** Les corbeaux sont les ravageurs causant chaque année le plus de dégâts et provoquant parfois un resemis des parcelles concernées, pour rappel il n'existe aucun moyen de lutte efficace à 100% !

L'objectif est de réunir l'ensemble des moyens de lutte préventifs :

- **Semis groupés (un semis trop précoce ou trop tardif vous exposera davantage)**
- **Passages réguliers dans les [...]**

## ➤ Désherbage

Avec le retour des pluies, les conditions seront plus favorables pour une intervention en pré-levée notamment pour les derniers semis. **Il ne faut surtout pas intervenir au stade pointant du maïs !** Pour les autres parcelles semées depuis une dizaine de jours, où les conditions étaient trop sèches pour intervenir, il pourra être envisagé une intervention en post précoce (1 à 2 feuilles du maïs) pour profiter du retour des pluies.

Le passage au semis est indispensable en cas de forte pression graminées.

Outre les graminées, la prélevée peut-être une solution en cas de risque dicots importants (véroniques, renouées ...).

**Nos préconisations :**

- **en pré-levée / post-levée précoce : [...]**
- **en post levée (2 passages et 1 passage) : [...]**

# ORGES

## ➤ Escourgeon

Les escourgeons sont dorénavant au stade « épiaison » à « sortie des étamines ».

**Si le dernier fongicide n'est pas réalisé, il convient de le réaliser rapidement maintenant.[...]**

**Nos préconisations en T2 : [...]**

**Ajout de SESTO ?** Depuis quelques années, ramulariose et grillures polliniques ont été notées lors de fins de cycle pluvieuses avec des impacts [...]

## ➤ Orge de printemps

**DESHERBAGE :** De nombreuses parcelles sont au stade « 2 nœuds ». Si ce n'est fait, le désherbage ne doit plus tarder.

**Sur ray grass à moins de 2 [...]**

Lors de ce passage d'anti graminées, possibilité d'ajouter un antidicots (si dicots levées) : [...]

**REGULATEUR :** l'actualité est à la régulation des orges. Attention certaines parcelles ont souffert semaine dernière avant l'arrivée des pluies. Dans les cas les plus sévères, réaliser [...]

**FONGICIDE : Certaines orges en terres légères ont souffert semaine passée avant l'arrivée des pluies.**

**La situation sanitaire est globalement saine à ce jour et le retour des pluies laisse présager un développement rapide des stades dorénavant avec un traitement unique à « dernière feuille étalée ».**

En cas d'oïdium, [...]

## POMMES DE TERRE

### ➤ Désherbage

**Le désherbage est d'actualité quand les germes sont à 4-5cm de la sortie des buttes. De préférence à réaliser sur butte humide, mais si l'émergence est proche, il faut passer !**

**Attention au vent** pour la dérive sur les parcelles [...]

**Nos préconisations :** [...]

### ➤ Mildiou

**Rappel des mesures préventives : Il est important de bien gérer ses tas de déchets !**

Les tas de déchets qui sont présents permettent un inoculum primaire pour le mildiou, il est urgent de les gérer sachant que les premières parcelles sont en cours de levées :

- Soit par bâchage : [...]

### ➤ Tarifs MILEOS

Deux possibilités pour prendre votre abonnement MILEOS, sous réserve d'une couverture en station météo :

- Avec Mes Parcelles : 300€ HT (**Données météos incluses !**)
- Avec Sencrop : 450€ HT (données météo incluses)

Possible d'enregistrer jusqu'à 6 parcelles.  
Contactez votre conseiller.

## PROTEAGINEUX

### ➤ Protéagineux d'hiver

**Les protéagineux d'hiver sont actuellement en floraison, les féveroles ayant atteint un stade plus avancé que les pois. Ce stade de floraison correspond au début des interventions de protection fongicide.[...]**

**Nos préconisations :** [...]

### ➤ Protéagineux de printemps

**Les compléments anti-dicot sont à faire au cas par cas, en fonction de la flore observée.**

**Nos préconisations :** [...]

---

**Abonnez-vous à notre messagerie technique pour plus d'informations  
→ contactez Elyse LARTIGUE au 06 86 37 56 59**

---

La Chambre d'agriculture de la Somme est agréée pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sous le n° PI00740. Conseils basés sur les observations hebdomadaires et/ou sur les Bulletins de Santé du Végétal (BSV). Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans le Tech'Agro 2026.

**Avec ses 45 conseillers, la Chambre d'agriculture de la Somme est le premier réseau de conseil agricole, elle accompagne près d'une exploitation sur deux dans le département.**

Chambre d'agriculture de la Somme

19 Bis Rue Alexandre Dumas, 80090 Amiens - Tél : 03 22 33 69 00 - [www.hautsdefrance.chambre-agriculture.fr](http://www.hautsdefrance.chambre-agriculture.fr)

